



Criterios de Diagnostico para el Síndrome de Prader Willi

Mensaje y Pedido al Profesional interviniente :

Los Criterios de Diagnostico de Holm et al. (1993) son los mas utilizados actualmente, pero se han “bajado” los requisitos para el test genético a partir del estudio “ The Changing Purpose of Prader-Willi Syndrome Clinical Diagnostic Criteria and Proposed Revised Criteria” del año 2001, a solamente hipotonía con succión pobre en los recién nacidos ,(ver Tabla 3, traducida al castellano). Los dos criterios están en esta carpeta.

En la Republica Argentina, por nuestra experiencia de padres, se están utilizando los dos criterios, apoyados por la experiencia clínica (mayormente en el Hospital Garrahan de Buenos Aires que tiene hace años un Grupo Interdisciplinario trabajando en y con afectados por el Síndrome de Prader Willi.

En caso de la mas mínima duda rogamos encarecidamente, contactarse con la Asociacion (los mails están en la pagina de la Asociacion : <http://www.praderwilliarg.com.ar> o <http://www.praderwilliarg.8k.com>, para establecer el contacto con el Grupo Interdisciplinario del Hospital Garrahan.

El test genético es cubierto por todas las obras sociales, y en su defecto por el Estado, habiendo cupo para hacer el test a padres que no lo puedan solventar en caso de necesidad.

Hacemos este pedido, ya que sabemos por experiencia propia las enormes ventajas del Diagnostico Precoz (no solamente por la licencia maternal ampliada a 6 meses) .

Agradeciendo vuestro tiempo y dedicación.

Asociacion Civil para el Síndrome de Prader Willi (Argentina)